

## Wpływ odłogowania i dodatku trocin iglastych do gleby porolnej na jej właściwości chemiczne i zbiorowisko grzybów ektomykoryzowych 15-letniej sosny zwyczajnej

Influence of resting and pine sawdust application on chemical changes in post-agricultural soil and the ectomycorrhizal community of growing Scots pine saplings

Monika Małecka<sup>1\*</sup>, Dorota Hilszczańska<sup>2</sup>

Instytut Badawczy Leśnictwa, <sup>1</sup>Zakład Ochrony Lasu, <sup>2</sup>Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

\*Tel. +48 22 7150561, e-mail: M.Malecka@ibles.waw.pl

**Abstract.** Changes in chemical compounds and in ectomycorrhizal structure were determined for Scots pine growing on post agricultural soil lying fallow for 3, 6 and 15 years, after amendment with pine sawdust. Soil without any amendments was used as the control treatment. Comparing the ectomycorrhizal structure 15 years after the application of pine sawdust revealed no significant differences in abundance or species richness between soil with and without organic enrichment. The results showed that the ectomycorrhizal status depends on soil conditions (soil pH, nitrogen content), which remain unaffected by saw dust application. In all treatments, the most frequently occurring ectomycorrhizae genera were *Dermocybe*, *Hebeloma*, *Suillus*, *Tomentella* and *Tricholoma*. Two species (*Paxillus involutus*, *Amanita muscaria*) were specific to the control plots that lay fallow for 15 years.

**Keywords:** Scots pine, ectomycorrhizal fungi, agricultural lands, pine sawdust

### 1. Wstęp

Realizowany obecnie w Polsce plan zalesiania gleb wymaga poniesienia dużych nakładów na produkcję odpowiedniego materiału sadzeniowego, przygotowanie i wykonanie zalesień oraz na ochronę powstałych w ten sposób upraw i młodników. W latach 1945–2005 zalesienia wykonano na powierzchni 1395 tys. ha (Smykała 1988), zaś wg założeń KPZL przewidywano je w latach 1995–2020 na powierzchni około 680 tys. ha (Zaleski 2003). Część sadzonek hodowanych w odkrytych i kontenerowych szkółkach leśnych jest przeznaczana do zalesienia gruntów porolnych i nieużytków. Na tego typu terenach, które obejmują często gleby niskiej jakości czy długo odłogujące, bądź zniszczone przez przemysł, udatność nasadzeń może być o wiele niższa niż na glebach leśnych – przede wszystkim z uwagi na odmienną ich strukturę oraz cechy mikrobiologiczne, a zwłaszcza brak w nich grzybów mykoryzowych, antagonistycznych wobec patogenów.

Najwyższy udział (ok. 27%) wśród hodowanych w szkółkach gatunków drzew ma sosna zwyczajna (Zajączkowski 2008). Obecność u sadzonek sosny mykoryz jest istotna dla adaptacji i przeżywalności po wysadzeniu na nowe stanowiska, szczególnie na grunty porolne, gdzie ilość inokulum mykoryzowego jest ograniczona (m.in. Stenström, Ek 1990;

Hilszczańska, Sierota 2006; Iwański et al. 2006; Sierota, Hilszczańska 2009; Hilszczańska et al. 2012).

Inokulacja sadzonek z wykorzystaniem grzybów mykoryzowych jest jednym ze sposobów na podniesienie udatności nasadzeń i kondycji sadzonek. Alternatywą dla mykoryzacji sterowanej jest stymulacja procesów mikrobiologicznych w glebie poprzez stosowanie różnorodnych zabiegów hylo-technicznych, np. ściółkowania (Kowalski 1997) czy tzw. „domykoryzacji”, polegającej na stosowaniu substratów, zawierających zarodniki grzybów mykoryzowych (Hilszczańska 2007).

Odmienne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb rolniczych i leśnych sprawiają, że proces rozkładu materii organicznej na wymienionych glebach jest różny. Próchnica gleb rolniczych odznacza się dużą przewagą zawartości kwasów huminowych, podczas gdy próchnica gleb leśnych charakteryzuje się dużą zawartością kwasów fulowych. W związku z tym inny jest udział ilościowy i jakościowy mikroorganizmów zasiedlających te gleby, ze zdecydowaną przewagą bakterii nad grzybami w przypadku gleb rolniczych (Paul, Clark 2000). Stąd, stosowanie substratów organicznych w postaci kompostów, trocin czy pozostałości zrębowych na zalesianych gruntach poprawiało ich żyzność i stymulowało procesy mikrobiologiczne (Sobczak 1990; Go-

rzelak 1998; Sierota, Kwaśna 1999; Oszako, Olejarski 2003; Olejarski 2005). Wzrost liczby organizmów antagonistycznych w stosunku do patogenów korzeni powodował wzrost udatności i zdrowotności badanych młodych drzewostanów (Kwaśna et al. 2000).

Celem pracy była ocena chemizmu gleby oraz zbiorowiska grzybów mykoryzowych 15 lat od wykonania zabiegu, polegającego na dodaniu do gleby świeżych trocin iglastych. Badania prowadzono na powierzchni przeznaczonej do zalesienia w Nadleśnictwie Głębocki Bród (leśnictwo Gulbin, oddz. 320a).

## 2. Materiał i metody

Powierzchnia doświadczalna wielkości 5 arów została założona w 1995 r. na gruncie porolnym przeznaczonym pod zalesienie, którego naturalny układ przestrzenny obejmował trzy sąsiadujące ze sobą fragmenty, różniące się długością okresu odłogowania. W momencie rozpoczęcia eksperymentu nie były one uprawiane rolniczo przez okres 3, 6 i 15 lat (według informacji otrzymanych w Nadleśnictwie Głębocki Bród) i występowała na nich wyłącznie roślinność zielna. Jesienią rozsypano na wytyczonej części powierzchni warstwę około 5–8 cm świeżych trocin sosnowych (odpowiadającą 5–8 m<sup>3</sup>/ar), które zostały przyorane na głębokość około 35 cm. Wiosną 1996 r., po ponownym przeoranu i bronowaniu gleby, wysadzono 1-letnie sadzonki sosny zwyczajnej z miejscowej szkółki, w więźbie 1,0×1,5 m. Ówczesne możliwości dysponowania arealem powierzchni badawczych pozwoliły na wytyczenie jednego pasa powierzchni trocinowanej, składającego się z trzech rzędów drzew oraz dwóch sąsiadujących pasów powierzchni kontrolnej, również po 3 rzędy każda (łącznie 6 rzędów drzew kontrolnych) (ryc. 1). Rozmiary trzech poletek zlokalizowanych na części odłogowanej przez 3 lata (K3 i T3) wynosiły 20×4,5 m, natomiast pozostałe sześć powierzchni (na ugorze 6- i 15-letnim) były o połowę mniejsze (wymary 10×4,5 m). W konsekwencji, łączna wyjściowa (w 1996 r.) liczba drzew kontrolnych była dwukrotnie większa od liczby drzew na powierzchni z dodatkiem trocin (246 szt. vs 123 szt.). Taki układ przestrzenny gruntów odłogujących spowodował również różną wyjściową liczbę drzew rosnących na poszczególnych kategoriach nieużytków (ryc. 1).

W 2011 roku, po upływie 15 lat od założenia doświadczenia, wykonano analizy chemiczne gleby oraz ocenę ilościową i jakościową mykoryz na korzeniach drzew rosnących w poszczególnych wariantach doświadczenia.

Próbki gleby w celu oznaczenia jej składu chemicznego pobrano z głębokości do 20 cm, po usunięciu górnej warstwy ściółki. Badania wykonano zgodnie z metodyką przyjętą w międzynarodowym programie monitoringu lasów ICP Forests. Odczyn gleb (pH-H<sub>2</sub>O i pH-KCl) oznaczano metodą potencjometryczną według PN-ISO 103390:1997, zawartość węgla organicznego – metodą analizy elementarnej według PN-ISO10694:2002, zawartość azotu ogólnego – metodą analizy elementarnej według PN-13878:2002, zawartość

potasu, wapnia, magnezu w wyciągu octanu amonu według procedury PB-05 ed. 2, zaś fosfor łatwo rozpuszczalny (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) metodą Egnera-Riehma. Analizy wykonano w Samodzielnej Pracowni Chemii Środowiska Leśnego Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Próby gleby (bez górnej warstwy ściółki) wraz z korzeniami mykoryzowymi pobierano świdrem glebowym o średnicy 7 cm z głębokości 20 cm, w 3 punktach każdego wariantu doświadczenia, w sąsiedztwie drzewa. Objętość każdej próby wynosiła 0,7 dm<sup>3</sup>. Próby przewożono do laboratorium i umieszczano w chłodni w temp. 4°C. W celu oddzielenia mykoryz od gleby, po przesianiu na sitach, korzenie myto pod bieżącą wodą, a następnie umieszczano w pojemnikach z wodą destylowaną w chłodni, do czasu rozpoczęcia analiz. Obserwacje mykoryz wykonywano pod mikroskopem stereoskopowym przy powiększeniu 10–50 razy. Identyfikacji dokonywano na podstawie obecności i wyglądu mufki grzybniowej, grzybni ekstramatrykalnej oraz sznurów grzybniowych (Agerer 1987–2006; Agerer, Rambold 2004–2007, Ingelby et al. 1990). Dla każdego wariantu doświadczenia określano łączną liczbę występujących mykoryz oraz dokonywano ich identyfikacji do gatunku lub rodzaju. Na tej

	Powierzchnia kontrolna Control plot	Powierzchnia trocinowana Sawdust application plot	Powierzchnia kontrolna Control plot
Nieużytek 3-letni Fallow 3 years	K3 (62)	T3 (61)	K3 (62)
Nieużytek 6-letni Fallow 6 years	K6 (31)	T6 (32)	K6 (31)
Nieużytek 15-letni Fallow 15 years	K15 (30)	T15 (30)	K15 (30)

Rycina 1. Schemat powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Głębocki Bród, leśnictwie Gulbin. Oznaczenia: K – poletko kontrolne; T – poletko trocinowane; 3, 6, 15 – okres odłogowania (w latach); (...) – liczba drzew rosnących na danym poletku.

Figure 1. Study plot design in Głębocki Bród Forest District. Descriptions: K – control plot; T – plots with pine sawdust application; 3, 6, 15 – fallow period (years); (...) – number of trees on each plot.

podstawie wykonano analizę ilościową (średnia liczebność mykoryz) oraz porównawczą ocenę bogactwa gatunkowego, w przeliczeniu na 1 dm<sup>3</sup>.

Do oceny zróżnicowania liczebności zbiorowisk grzybów mykoryzowych w wariantach doświadczalnych zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA (program Statgraphics™ Centurion). Istotność różnic pomiędzy średnimi oceniano testem RIR Tukey'a. Do weryfikacji istotności różnic przyjęto 95% przedział ufności ( $p < 0,05$ ). W celu sprawdzenia struktury powiązań zróżnicowania grzybów mykoryzowych i stosowanych w doświadczeniu wariantów wykonano analizę korespondencji (pakiet Statistica 2008, StatSoft). Dane do analizy przygotowano w formie macierzy kodowej i zestawiono w tabeli, gdzie jako zmienne traktowano warianty doświadczenia.

### 3. Wyniki

Wyjściowy (zmierzony w 1995 r. przed założeniem doświadczenia) odczyn gleby na powierzchniach reprezentujących różne okresy odłogowania był zróżnicowany (tab. 1), najwyższy (pH=7) dotyczył ugoru 6-letniego, najniższy zaś 3-letniego (pH=4,4). Po piętnastu latach od zastosowania trocin i posadzenia drzew odczyn ustabilizował się na poziomie 4,7–5,8, przy czym jego wyższe wartości (względem kontroli) charakteryzowały glebę wzbogaconą trocinami. Przy niemal niezmienniej zawartości azotu (N%) na poziomie 0,6–0,9 w podłożu, zawartość węgla (C%) wzrosła dwukrotnie, przyjmując we wszystkich wariantach ugorowania nieznacznie wyższe wartości w glebie trocinowanej. Wartość wskaźnika C/N, kształtująca się w 1995 r. w zakresie charakterystycznym dla gleb porolnych (13,2–14,7), zwiększyła się po 15 latach w najmniejszym stopniu (16,85) na ugorze 3-letnim, w największym zaś (28,7) na ugorze 15-letnim, w obydwu przypadkach dotyczyło to gleby z do-

datkiem trocin. Zarejestrowana w 2011 r. zawartość fosforu była większa od wyjściowej, z wyjątkiem gleby ugorowanej 3 lata, gdzie z dużej ilości (10,7 mg/100 g P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) zmniejszyła się o około połowę. W przypadku potasu, jego zawartość po 15 latach była wyższa od wyjściowej tylko w glebie odłogowanej 3 lata, na pozostałych typach ugorów zmniejszyła się nieznacznie. Zawartość magnezu i wapnia zmalała względem wyjściowej wartości w prawie wszystkich analizowanych przypadkach, z wyjątkiem odłogującej 3 lata gleby poddanej zabiegowi trocinowania.

Pod względem liczebności mykoryz większymi wartościami tej cechy charakteryzowały się korzenie drzew rosnących w glebie z dodatkiem trocin (średnio 239,3 szt.), na korzeniach drzew kontrolnych stwierdzono średnią liczebność mykoryz na poziomie 181 szt., przy czym różnice pomiędzy wariantami nie były statystycznie istotne (ryc. 2a).

Największą liczbę żywych mykoryz (około 300 szt.) stwierdzono na korzeniach drzew rosnących w glebie poddanej zabiegowi trocinowania posadzonych na glebie odłogowanej 3 i 15 lat (ryc. 2b). W przypadku drzew kontrolnych rosnących w analogicznie odłogowanej glebie wartości tego parametru były znacznie mniejsze (odpowiednio 213 i 123 szt.). Z kolei dla ugoru 6-letniego w wariantach kontrolnych stwierdzono wyższą liczbę mykoryz niż w wariantach zabiegowych, który charakteryzował się najniższą liczebnością spośród wszystkich (101 szt.). Analiza statystyczna nie wykazała jednakże istotnych różnic pomiędzy omawianymi wariantami dla tego parametru.


Na korzeniach obecnych w pobranych próbkach glebowych wyróżniono ogółem 22 morfotypy mykoryz, w przypadku 12 morfotypów określono gatunek, a dla 10 morfotypów rodzaj tworzących je grzybów (tab. 2). Liczba morfotypów w poszczególnych wariantach doświadczenia na powierzchni badawczej była zbliżona i wynosiła od 9 do 15. Skrajne liczebności morfotypów były charakterystyczne

**Tabela 1. Wartości niektórych parametrów chemicznych gleby w wariantach zabiegowych w dwóch terminach oceny**

Table 1. Soil parameters for the treatments in two terms of evaluation

Parametry chemiczne gleby Soil parameters	Ugór 3-letni / Fallow 3 years			Ugór 6-letni / Fallow 6 years			Ugór 15-letni / Fallow 15 years		
	1995*	2011		1995*	2011		1995*	2011	
		Trociny Sawdust	Kontrola Control		Trociny Sawdust	Kontrola Control		Trociny Sawdust	Kontrola Control
pH H <sub>2</sub> O	4,4	5,8	5,2	7,0	4,9	4,7	5,1	4,9	4,7
pH KCl	3,8	5,23	4,3	6,0	4,3	4,0	4,1	4,1	4,1
C (%)	0,87	1,525	1,163	0,98	2,030	2,015	1,2	2,385	2,040
N (%)	0,059	0,066	0,069	0,071	0,083	0,098	0,091	0,083	0,088
C/N	14,7	23,11	16,85	13,8	24,46	20,56	13,2	28,7	23,18
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (mg/100g)	10,7	6,4	5,1	2,4	6,7	5,5	1,1	3,2	3,3
K (mg/100g)	1,2	4,8	3,7	5,0	4,3	4,3	4,0	3,7	2,9
Ca (mg/100g)	18,5	40,1	16,3	143,5	13,8	5,1	32,5	10,6	6,7
Mg (mg/100g)	2,5	1,9	0,7	9,2	1,2	0,6	2,5	0,5	0,3

\* Źródło / Source: Sierota, Kwaśna (1998)



Rycina 2. Liczebność mykoryz na korzeniach drzew rosnących na powierzchni doświadczalnej w układzie: a – wariantów zabiegowych ( $p=0,2594$ ), b – gleb o różnym czasie odlogowania ( $p=0,1290$ ). Oznaczenia wariantów jak na ryc. 1.

Figure 2. Number of mycorrhizae associated with Scots pine roots growing in: a – different treatments ( $p=0,2594$ ), b – soils at different fallow period ( $p=0,1290$ ). Descriptions as in the fig. 1.

Tabela 2. Lista grzybów tworzących mykoryzy z sosną zwyczajną oraz ich obecność w badanych wariantach zabiegowych

Table 2. Mycorrhizal fungal taxa associated with Scots pine roots and their presence in the studied treatments

Lp. No.	Gatunek lub rodzaj grzyba mykoryzowego Fungal taxa	Trociny / Sawdust			Kontrola / Control		
		ugór 3-letni fallow 3 years (T3)	ugór 6-letni fallow 6 years (T6)	ugór 15-letni fallow 15 years (T15)	ugór 3-letni fallow 3 years (K3)	ugór 6-letni fallow 6 years (K6)	ugór 15-letni fallow 15 years (K15)
1	<i>Amanita muscaria</i>						+
2	<i>Cenococcum geophilum</i>	+		+			
3	<i>Cortinarius odorifer</i>			+	+	+	
4	<i>Cortinarius</i> sp.	+	+	+	+		
5	<i>Dermocybe palustris</i>	+			+		+
6	<i>Dermocybe semisanguinea</i>	+	+	+	+	+	+
7	<i>Dermocybe</i> sp.					+	
8	<i>Elaphomyces</i> sp.		+		+		
9	<i>Hebeloma crustuliniforme</i>			+	+		
10	<i>Hebeloma edurum</i>						+
11	<i>Hebeloma sacchariolens</i>			+	+		
12	<i>Hebeloma</i> sp.	+	+	+	+	+	+
13	<i>Paxillus involutus</i>						+
14	<i>Rhizopogon</i> sp.				+		
15	<i>Russula</i> sp.		+				
16	<i>Suillus luletus</i>	+	+			+	+
17	<i>Suillus</i> sp.	+	+	+	+		+
18	<i>Thelephora terrestris</i>	+		+	+	+	+
19	<i>Tomentella ferruginea</i>		+	+	+	+	+
20	<i>Tomentella</i> sp.	+	+	+	+		+
21	<i>Tricholoma</i> sp.	+	+	+	+	+	+
22	<i>Wilcoxina</i> sp.	+			+	+	
Łącznie (wg ugorów) / Total (for fallows)		11	10	12	15	9	12
Łącznie (wg zabiegów) / Total (for treatments)			17			20	

dla drzew z powierzchni kontrolnych, ugorowanych 3 i 6 lat. W przypadku powierzchni z dodatkiem trocin największe bogactwo gatunkowe stwierdzono na ugorze 15-letnim (12 morfotypów), podobnie jak w przypadku powierzchni kontrolnej, odłogowanej 15 lat. Rozpatrując wyniki jedynie pod względem wykonania lub niewykonania zabiegu trocinowania, niezależnie od długości okresu odłogowania, można stwierdzić, że na powierzchni trocinowanej bogactwo gatunkowe było nieco mniejsze niż na powierzchni kontrolnej (łącznie odpowiednio 17 i 20 morfotypów).

Wykonane analizy bogactwa gatunkowego grzybów ektomykoryzowych wykazały, że grzyby należące do rodzajów *Dermocybe*, *Hebeloma*, *Suillus*, *Tomentella* oraz *Tricholoma*, miały wszędobylski charakter, gdyż występowały na próbkach korzeni pobranych we wszystkich 6 wariantach doświadczenia. Bardzo nielicznie występowały mykoryzy tworzone przez *Cenococcum geophilum*, *Elaphomyces* sp., *Rhizopogon* sp., *Russula* sp., *Paxillus involutus*, *Amanita muscaria*, przy czym dwa ostatnie z wymienionych gatunków stwierdzono jedynie na korzeniach drzew z powierzchni kontrolnej, odłogującej 15 lat.


Analiza korespondencji (ryc. 3) zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych pokazała strukturę powiązań między mykoryzami a badanymi wariantami doświadczenia. Jakość reprezentacji poszczególnych danych jest wysoka i wynosi przeciętnie około 0,72 (wartość maksymalna =1), pierwszy wymiar (oś X) wyjaśnia 42,07% tej zmienności, zaś oś Y (wymiar drugi) dalsze 29,7%. Największy wkład w ogólną bezwładność wierszy (tutaj gatunki grzybów tworzące mykoryzy) mają gatunki znajdujące się w największej odległości od osi przebiegającej w punkcie 0,0, czyli *Amanita musca-*

*ria*, *Paxillus involutus*, *Elaphomyces* sp. i *Russula* sp. (ryc. 3). Z kolei największy wkład w ogólną bezwładność kolumn (warianty doświadczenia) ma zabieg trocinowania na odłogowanym przez 6 lat gruncie (poletko T6) oraz brak zabiegów na odłogowanym przez 15 lat gruncie (poletko K15). Sadzonki sosny rosnące w pozostałych wariantach, tj. K3, K6, T3 i T15, miały podobną strukturę jakościową mykoryz.

#### 4. Dyskusja

Po 15 latach od zastosowania zabiegu trocinowania, bogactwo gatunkowe mykoryz kształtowało się na analizowanych powierzchniach badawczych na podobnym poziomie. Brak wyraźnych różnic między jakościowym stanem mykoryz u sosny, rosnącej na glebie wzbogaconej trocinami i glebie niewzbogaconej, może wynikać z kilku przyczyn. Jedną z nich wydaje się podobny odczyn podłoża i zawartość azotu. Istotnych różnic w liczbie gatunków grzybów mykoryzowych kolonizujących korzenie można się spodziewać, jeśli występują zróżnicowania mikrosiedliskowe, np. w składzie chemicznym gleby, odczynie podłoża, poziomie wilgotności i temperatury (Last et al. 1987; Blasius, Oberwinkler 1989; Jumpponen et al. 1999; Buee et al. 2005). Kolejną przyczyną mogą być oddziaływania konkurencyjne między organizmami dzielącymi wspólną niszę ekologiczną z grzybami mykoryzowymi, np. grzybami saprotroficznymi czy glebowymi bezkręgowcami (Kwaśna et al. 2000).

Badania stanu mykoryz w kilkuletnich uprawach sosnowych na gruntach porolnych wskazują na duże podobieństwo ilościowe i jakościowe zbiorowisk grzybów ektomykory-



**Rycina 3.** Pierwszy i drugi wymiar analizy korespondencji dla zbiorowisk mykoryz sosny zwyczajnej z różnych wariantów doświadczenia. Oznaczenia grzybów: Aman – *Amanita muscaria*, Cen – *Cenococcum geophilum*, Cort – *Cortinarius* sp., Derm – *Dermocybe* sp., Ela – *Elaphomyces* sp., Heb – *Hebeloma* sp., Pax – *Paxillus involutus*, Rh – *Rhizopogon* sp., Rus – *Russula* sp., Suil – *Suillus* sp., Th – *Thelephora terrestris*, Tom – *Tomentella* sp., Trich – *Tricholoma* sp., Wilc – *Wilcoxina* sp. Oznaczenia wariantów doświadczenia jak w tabeli 2.

Figure 3. Correspondence analysis (CA) comparing mycorrhizal community of Scots pine in different treatments. Description of fungi as above, descriptions of treatments as in table 2.

zowych (Hilszczańska et al. 2008; Sierota, Hilszczańska 2009; Małecka, Hilszczańska 2014). Wydaje się, że na taki stan istotnie wpływa dostępność inokulum mykoryzowego i zmiany zachodzące w zbiorowisku organizmów zasiedlających ryzosferę. W ekosystemach leśnych wzrost różnorodności mykoryz u daglezi (*Pseudotsuga menziessi*) był najbardziej widoczny dla drzewostanów mających od 5 do 26 lat (Twieg et al. 2007). Podobny schemat może obowiązywać w przypadku sosny zwyczajnej (*Pinus sylvestris*), jednak z tą różnicą, że w przypadku drzewostanów rosnących na gruntach porolnych ten proces może zachodzić wolniej z uwagi na m.in. odmienną biologię gleby.

Analizując efektywność symbiozy ektomykoryzowej dla wzrostu i odżywienia drzew na podstawie typu grzybni ektramatykalnej (glebowej) grzybów mykoryzowych (Agerer 2001), obecność mykoryz tworzonych przez *Cortinarius* sp. u sosny z wariantów, gdzie wykonano trocinowanie, przemawia za stosowaniem tego zabiegu. Grzybnia *Cortinarius* spp. reprezentuje tzw. średniodystansowy typ grzybni eksploracyjnej (Agerer 2001). Sadzonki posiadające takie mykoryzy są zdolne pobierać z próchnicznej warstwy gleby większe ilości azotu, fosforu i potasu, niż sadzonki z mykoryzami tworzącymi tzw. krótkodystansowy typ grzybni eksploracyjnej (Bendig, Read 1995). W strukturze mykoryz dominowały mykoryzy tworzone przez grzyby typowe dla młodocianego stadium sosny (*Suillus* spp., *Hebeloma* spp., *Wilcoxina* sp.) i grzyby uniwersalne, tj. występujące na korzeniach niezależnie od wieku rośliny – gospodarza (*Thelephora terrestris*, *Tomentella* sp.). Obecność mykoryz reprezentujących różne strategie i funkcje życiowe dobrze prognozuje rozwojowi sadzonek. Przykładowo, grzyby *Suillus* spp. reprezentują długodystansowy typ grzybni eksploracyjnej (Agerer 2001) i są hydrofobowe (Unestam, Sun 1995), podczas, gdy *Thelephora terrestris* jest gatunkiem hydrofilnym. Brak istotnych różnic w liczbie mykoryz u sosny rosnącej w glebie wzbogaconej trocinami i sosny z wariantu kontrolnego wydaje się pozostawać w ścisłym związku ze zbliżoną charakterystyką chemiczną gleb. Odczyn gleb, różny w glebach poszczególnych ugorów, który zmienił się już w pierwszym (Sierota, Kwaśna 1998b) i drugim (Sierota, Kwaśna 1999; Kwaśna et al. 2000) roku po zastosowaniu zabiegu trocinowania i zalesieniu powierzchni, utrzymał się na podobnym, wyrównanym poziomie przez kolejne lata wzrostu drzew. Wzbogacenie gleby trocinami wraz z przyoraniem darni porastającej glebę spowodowało w ciągu roku ponad dwukrotne zwiększenie zasobów glebowego węgla organicznego (SOC), co przy niewielkich zmianach zawartości azotu, przełożyło się na gwałtowny wzrost wartości stosunku C:N, kształtujących się wówczas w zakresie 28–38, zależnie od wariantu odłogowania (Sierota, Kwaśna 1998b). Analizy gleby wykonane po 15 latach od zabiegu wykazały, że obecnie wartości C/N w glebie trocinowanej ustabilizowały się na poziomie 23–28 (tab. 1), charakterystycznym dla gleb spod drzewostanów sosnowych (Wawrzoniak et al. 2004; Małecka et al. 2014). W przypadku omawianego zalesionego nieużytku może to świadczyć

o długotrwałym stanie równowagi pomiędzy ilością węgla docierającą do gleby z resztkami organicznymi a jego utratą – głównie poprzez rozkład materii organicznej. Porównując zawartość wapnia 15 lat po zabiegu, zwraca uwagę jego wyższy poziom w glebie trocinowanej względem kontrolnej, niezależnie od okresu ugorowania. Wskazywałoby to na utrzymujący się wciąż efekt rozkładu struktur drewna trocin, gdyż pierwiastek ten stanowi u sosny około 40% suchej masy drewna (Kollmann 1951). Przy analizowaniu zmian w chemizmie gleby nie można pominąć roli edafonu, którego aktywność wiąże się zarówno z mineralizacją materii organicznej do prostych związków nieorganicznych (tzw. immobilizacja), jak i z ich konsumpcją (wtórna immobilizacja). Liczne badania nad zbiorowiskiem grzybów glebowych (Sierota, Kwaśna 1998a,b; Kwaśna, Sierota 1999; Sierota, Kwaśna 1999; Kwaśna et al. 2000) wykazały, że po zabiegu trocinowania gleby, wraz ze zmianami w chemizmie gleby następowały transformacje ilościowe i jakościowe w strukturze zbiorowisk grzybów glebowych. Najważniejszym elementem tych przekształceń było pojawienie się gatunków antagonistycznych względem patogenów korzeni (przede wszystkim rodzaju *Trichoderma*) oraz innych uczestniczących w kolonizacji i rozkładzie substratu trocinowego. Wprowadzenie trocin zaktywizowało również środowisko nicieni glebowych, w którym zaczęły dominować nicienie bakteriożercze, zaś wielokrotnie zmniejszył się udział nicieni-pasożytów roślin (Kwaśna et al. 2001).

Zbiorowisko grzybów wchodzących w układy mykoryzowe z korzeniami drzew jest nieodłącznym elementem świata mikroorganizmów glebowych, a jego skład ilościowy i jakościowy pozostaje w ścisłym związku z przebiegiem procesów mikrobiologicznych i chemicznych zachodzących w glebie. Dominacja ilościowa dwóch gatunków grzybów glebowych: *Geomyces pannorum* (Link) Sigler & J.W. Carmich (gatunek występujący powszechnie w glebach, również zdegradowanych i porolnych) i *Pseudogymnoascus roseus* Raiłło (grzyb związany z glebą i znajdującymi się w niej korzeniami oraz drewnem), znikoma ilość grzybów rodzaju *Trichoderma*, nieobecność w środowisku glebowym grzybów patogenicznych (*Pythium*, *Phytophthora*, *Heterobasidion annosum*) (Małecka 2012) oraz wspomniane powyżej charakterystyki chemizmu gleby ukształtowały ryzosferę drzew doświadczalnych. Aczkolwiek nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w liczbie mykoryz w zależności od wariantu doświadczenia, to wyższą ich liczbę odnotowano w przypadku dwóch wariantów z zastosowaniem trocinowania gleby. Wprowadzenie tego substratu organicznego wpłynęło zapewne na napowietrzenie gleby (Kwaśna et al. 2000), a tym samym stymulację tworzenia mykoryz. Nie znajduje wytłumaczenia fakt, dlaczego w przypadku sosny, rosnącej w wariantcie 6-letniego ugoru i trocinowania odnotowano najniższą liczbę mykoryz. Być może usytuowanie drzew należących do tego wariantu wewnątrz powierzchni doświadczalnej (ryc. 1) miało wpływ na ograniczanie rozwoju systemów korzeniowych, a tym samym i mykoryz. Duże znaczenie w tego typu rozważaniach mają dane historyczne, dające obraz analizowanych

powierzchni przed rozpoczęciem prac doświadczalnych, lecz w tym przypadku są one niedostępne.

Dodanie trocin do gleby wpłynęło pozytywnie na średnią wielkość pierśnicy drzew zabiegowych, która, choć nie w sposób statystycznie istotny, była większa od średniej pierśnicy drzew kontrolnych (Małecka 2012). Można przypuszczać, że skład ilościowy i jakościowy mykoryz w pierwszych latach wzrostu sadzonek miał wpływ na ich większy przyrost, co znajduje potwierdzenie w archiwalnych wynikach badań, odnoszących się do zróżnicowania wysokości i przyrostów wysokości, które wskazywały na drzewa z poletek zabiegowych jako lepiej przyrastające w pierwszych latach po ich posadzeniu (Sierota et al. 2002). Podobne zależności wykazano w przypadku oporu elektrycznego tkanek przykambialnych drzew, mierzono go w tych obiektach (Małecka 2012), który może być pośrednio miernikiem kondycji zdrowotnej drzew (Ubysz 2001). Z interakcji otrzymanych danych wynikało, że niższe wartości oporu elektrycznego (większa przewodność tkanek) wykazano u drzew rosnących na powierzchni trocinowanej (niezależnie od okresu odłogowania) i były to różnice statystycznie istotne względem drzew kontrolnych. Najniższe wartości tego parametru (świadczące o najlepszej kondycji zdrowotnej) wykazywały drzewa rosnące na glebie trocinowanej odłogującej 3 lata, co znajduje potwierdzenie zarówno w analizie przeżywalności drzew w poszczególnych wariantach ugorowania gleby (Małecka 2012), jak i liczebności mykoryz w korzeniach tych drzew (ryc. 2b). Analogiczne zgodności wykazano, analizując wskaźnik oporności tkanek drzew, który przyjmował większe wartości u drzew o słabszej kondycji zdrowotnej (tu: rosnących w wariantcie kontrolnym) (Małecka 2012).

## 5. Podsumowanie

Badania wykazały zróżnicowany wpływ zabiegu trocinowania odłogującej gleby porolnej na liczbę mykoryz – najwyższą ich liczbą charakteryzowały się 15-letnie sosny rosnące w glebie z dodatkiem trocin, jakkolwiek nie wykazano istotnych różnic między średnimi pomiędzy wariantami. Stan jakościowy mykoryz był zbliżony, nie stwierdzono również istotnych statystycznie zmian liczby morfotypów mykoryz wraz z długością okresu odłogowania. W strukturze mykoryz dominowały grzyby o charakterze wszędobylskim. Zawartość dostępnego azotu w glebie, analizowana na podstawie relacji C/N, zmniejszała się proporcjonalnie do okresu odłogowania, zwłaszcza w wariantach zabiegowych ugorów 6- i 15-letniego, co wyraziło się wzrostem wartości C/N na poletkach „trocinowanych”. Obniżona zawartość azotu w glebie mogła mieć wpływ na wytworzenie większej liczby mykoryz w wariantcie ugoru 15-letniego w glebie trocinowanej.

## Konflikt interesów

Autorzy deklarują brak potencjalnych konfliktów.

## Podziękowania i źródła finansowania

Praca została wykonana w ramach tematu badawczego 240304, zrealizowanego ze środków MNiSW.

## Literatura

- Agerer R. 2001. Exploration types of ectomycorrhizae. *Mycorrhiza* 11(2): 107–114.
- Agerer R., 1987–2006. Colour Atlas of Ectomycorrhizae, Einhorn Verlag, Schwabisch-Gmünd.
- Agerer R., Rambold G. 2004–2010. DEEMY-An information system for characterization and determination of ectomycorrhizae, Munich, Ludwig Maximilians Univ. <http://www.deemy.de> [6.03.2013].
- Bending G.D., Read D.J. 1995. The structure and function of the vegetative mycelium of ectomycorrhizal plants. V. Foraging behaviour and translocation of nutrients from exploited organic matter. *New Phytologist* 130: 401–409.
- Blasius D., Oberwinkler F. 1989. Succession of mycorrhizae: a matter of tree age or stand age? *Annals of Forest Science* 46: 758–761. DOI 10.1051/forest:198905ART0169.
- Buee M., Vairelles D., Garbaye J. 2005. Year-round monitoring of diversity and potential metabolic activity of the ectomycorrhizal community in a beech (*Fagus sylvatica*) forest subjected to two thinning regimes. *Mycorrhiza* 15: 235–245. DOI: 10.1007/s00572-004-0313-6.
- Fonder W. 2002. Organizacyjne i ekonomiczne aspekty zwiększania lesistości w Polsce. *Postępy Nauk Rolniczych* 49/54 (3): 41–50.
- Gorzela A. 1998. Rola substancji organicznych w podnoszeniu produktywności wydym oraz słabszych gruntów porolnych. *Sylwan* 8: 27–33.
- Hilszczańska D. 2007. Wykorzystanie zarodników *Scleroderma citrinum* Pers. do mykoryzacji sadzonek sosny zwyczajnej, w: Ektomykoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym. (red. S. Kowalski) Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 258–263.
- Hilszczańska D., Sierota Z. 2006. Wpływ inokulum mykoryzowego grzyba *Thelephora terrestris* na wzrost sadzonek sosny *Pinus sylvestris* L. II. Badania polowe. *Sylwan* 2: 20–28.
- Hilszczańska D., Małecka M., Sierota Z. 2008. Changes in nitrogen level and mycorrhizal structure of Scots pine seedlings inoculated with *Thelephora terrestris*. *Annals of Forest Science* 65 (409): 1–6. DOI: 10.1051/forest:2008020.
- Hilszczańska D., Sierota Z., Małecka M., 2012. Ectomycorrhizal status of Scots pine saplings growing in post-agricultural soils. *Polish Journal of Environmental Studies* 21(1): 83–88.
- Iwański M., Rudawska M., Leski T. 2006. Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) seedlings in Poland. *Annals of Forest Science* 63(7): 715–724.
- Jumpponen A., Trappe J. M., Cazares E. 1999. Ectomycorrhizal fungi in Lyman Lake Basin: a comparison between primary and secondary succession sites. *Mycologia* 91: 575–582.
- Kollmann F. 1951. Technologie des Holzes und Holzwerkstoffe. Berlin.
- Kowalski S. 1997. Praktyczne aspekty mikrotrofizmu w szkółkach leśnych. *Sylwan* 6: 5–15.
- Kwaśna H., Sierota Z. 1999. Structure of fungal communities in barren post agricultural 1- and 2-years after pine sawdust application. *Phytopathologia Polonica* 17: 13–21.

- Kwaśna H., Brzeski M.W., Sierota Z. 2001. Mikroorganizmy środowiska glebowego odłogujących gruntów porolnych – zmiany w zbiorowiskach grzybów i nicieni po dodaniu trocin iglastych, w: Drobnoustroje środowiska glebowego – aspekty fizjologiczne, biochemiczne, genetyczne (red. H. Dahm, A. Pokojka). Toruń, Wyd. A. Marszałek, 57–66.
- Kwaśna H., Sierota Z., Bateman G.L. 2000. Fungal communities in fallow soil before and after amending with pine sawdust. *Applied Soil Ecology* 14: 177–182.
- Last F.D., Dighton J., Mason P.A. 1987. Successions of sheathing mycorrhizal fungi. *Trends in Ecology and Evolution* 2: 157–161.
- Małecka M. 2012. Zmiany w zbiorowiskach grzybów zasiedlających zalesione nieużytki rolne, zachodzące po upływie 10 i 15 lat od dodania substratów organicznych (trociny, komposty, odpady zrębowe) oraz ich wpływ na wzrost sosny zwyczajnej. Sękocin Stary, Dokumentacja Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa.
- Małecka M., Hilszczańska D. 2014. Wpływ wzbogacenia gleby porolnej substratami organicznymi na strukturę zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych sosny zwyczajnej. *Sylwan* 158(4): 243–250.
- Małecka M., Wójcik J., Sierota Z. 2014. Zmiany w składzie chemicznym gleby leśnej i porolnej po wprowadzeniu trocin iglastych na tle przebiegu elementów pogody. *Leśne Prace Badawcze* 75(2): 139–148. DOI 10.2478/frp-2014-0013.
- Olejarski I. 2005. Wykorzystanie pozostałości zrębowych do nawożenia organicznego gruntów porolnych. *Postępy Techniki w Leśnictwie* 92: 20–24.
- Sierota Z., Małecka M., Duda B., Hilszczańska D., Lech P., Lissy M., Oszako T., Piwnicki J., Smyklińska D., Żółciak A. 2002. Opracowanie zasad postępowania profilaktyczno-ochronnego drzewostanów na gruntach porolnych i zrębach oraz metody zwalczania szeliniaków przy wykorzystaniu fitopreparatów. Etap 1. Działania profilaktyczno-ochronne w drzewostanach na gruntach porolnych. Warszawa, Dokumentacja Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa.
- Oszako T., Olejarski I. 2003. Inicjowanie procesów przekształcenia gleb porolnych w gleby leśne poprzez wykorzystanie pozostałości zrębowych, kompostów i trocin. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, Ser. A. (1): 76–79.
- Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMC-S, Lublin.
- Sierota Z., Kwaśna H. 1998a. Changes in fungal communities in abandoned farmland soil enriched with pine sawdust. *Folia Forestalia Polonica*, Ser. A – Forestry 40: 85–94.
- Sierota Z., Kwaśna H. 1998b. Effect of pine sawdust on the structure of fungi communities in the soils of post agricultural land. *Acta Mycologica* 33(1): 77–90.
- Sierota Z., Kwaśna H. 1999. Ocena mikologiczna zmian zachodzących w glebie gruntu porolnego po dodaniu trocin iglastych. *Sylwan* 4: 57–66.
- Sierota Z., Hilszczańska D. 2009. Struktura ektomykoryz i parametry biometryczne sosny po wysadzeniu na gruncie porolnym. Ectomycorrhizal structure and biometric parameters of pine after planting on post-agricultural land. *Sylwan* 153(2): 108–116.
- Smykała J. 1988. Historia, rozmiar i rozmieszczenie zalesień gruntów porolnych w Polsce w okresie powojennym (1956-1987). Leśne zagospodarowanie gruntów porolnych. PTL, Warszawa, 5–15.
- Sobczak R. 1990. Teoretyczne i praktyczne aspekty zakładania upraw i prowadzenia drzewostanów na gruntach porolnych. *Sylwan* 3(12): 61–74.
- Stenström E., Ek M. 1990. Field growth of *Pinus sylvestris* following nursery inoculation with mycorrhizal fungi. *Canadian Journal of Forest Research* 20: 914–918.
- Twieg B. D., Durall D. M., Simard S. W. 2007. Ectomycorrhizal fungal succession in mixed temperate forests. *New Phytologist* 176(2): 437–447. DOI: 10.1111/j.1469-8137.2007.02173.x.
- Ubysz B. 2001. Ocena stanu żywotności jesionu wyniosłego (*Fraxinus excelsior* L.) w drzewostanach po powodzi w 1997 roku na terenie Nadleśnictwa Przytok. *Sylwan* 4: 57–65.
- Unestam T., Sun Y.P. 1995. Extramatrical structures of hydrophobic and hydrophilic ectomycorrhizal fungi. *Mycorrhiza* 5: 301–311.
- Wawrzoniak J., Małachowska J., Fałtynowicz W., Janek M., Kluźniński L., Kolk A., Lech P., Solon J., Wójcik J., Załęski A. 2004. Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa.
- Zajączkowski P. 2008. Duże wypierają małe. *Las Polski* 14–15.
- Zaleski J. 2003. Zalesienia w PGL Lasy Państwowe, w: Zalesienia w Europie. Doświadczenia i zamierzenia (red. A. Zajac i W. Gil). Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 270 s. ISBN 8387647330.

## Wkład autorów

M.M. – koncepcja pracy, prace terenowe, opracowanie statystyczne, przegląd literatury, pisanie manuskryptu, korekta; D.H. – ocena mykoryz, przegląd literatury, pisanie manuskryptu, korekta.